

- Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug.
- Fill the 3-liter jug from the well.
- Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug.
- Fill the 3-liter jug from the well.
- Fill the 7-liter jug with water from the 3-liter jug. (*one more liter of water can be poured, so that the 3-liter jug still contains 2 liters of water*)
- Empty the 7-liter jug.
- Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug. (*the 7-liter jug now contains 2 liters of water*)
- Fill the 3-liter jug from the well.
- Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug.
- The 7-liter jug now contains 5 liter.

An alternate solution can be found by drawing a second zigzag line Z' (red line) on top of OP . This line always visits the right neighbour if that point is above the line OP , otherwise it visits the top neighbour. In reading this solution, we swap the roles of a and b given above. In our example, the alternative map instructs us to

- Fill the 7-liter jug from the well.
- Fill the 3-liter jug with water from the 7-liter jug.
- Empty the 3-liter jug.
- Fill the 3-liter jug with water from the 7-liter jug. (*remains 1 liter of water in the 7-liter jug*)
- Empty the 3-liter jug.
- Pour the content of the 7-liter jug in the 3-liter jug. (*the 3-liter jug now contains 1 liter of water*)
- Fill the 7-liter jug from the well.
- Fill the 3-liter jug with water from the 7-liter jug. (*2 liters of water are poured*)
- The 7-liter jug now contains 5 liter.

In his book Grossman stated that "There are always exactly two solutions which are in a sense complementary to each other."

Assignment

- Write a function `position` that takes two points p_1 and p_2 . Each point is represented as a tuple containing two integers (x, y) . The function must return an integer that indicates whether point p_2 is on (value 0), above (value 1) or below (value -1) the line that goes through the origin $(0, 0)$ and the point p_1 .
Hint: If p_1 is the point (a, b) , the line connecting this point with the origin is described by the equation $ay - bx = 0$. For points (x, y) that are above this line, the expression $ay - bx$ is positive, and for points that are below the line the expression is negative.
- Write a function `wellDone` that takes three integers a , b and c . The function must print the actions needed to retrieve exactly c liters of water using an a -liter jug and a b -liter jug. Finally, the function should also print which jug has the requested volume of water. You may assume that the positive integers a and b are not the same, are relatively prime and that the volume of at least one of the jugs is larger than c liters. Make sure that your implementation of the function prints the description of the actions in exactly the same way as in the examples below. The function must also have an optional fourth parameter `alternative` that indicates whether the first solution (value `False`, the default value) or the

alternative solution (value True) should be printed.

Example

```
>>> position((3, 7), (3, 0))
-1
>>> position((3, 7), (0, 3))
1
>>> position((3, 7), (6, 14))
0
```

```
>>> wellDone(7, 3, 5)
Fill the 3-liter jug from the well.
Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug.
Fill the 3-liter jug from the well.
Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug.
Fill the 3-liter jug from the well.
Fill the 7-liter jug with water from the 3-liter jug.
Empty the 7-liter jug.
Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug.
Fill the 3-liter jug from the well.
Pour the content of the 3-liter jug in the 7-liter jug.
The 7-liter jug now contains 5 liter.
```

```
>>> wellDone(7, 3, 5, alternative=True)
Fill the 7-liter jug from the well.
Fill the 3-liter jug with water from the 7-liter jug.
Empty the 3-liter jug.
Fill the 3-liter jug with water from the 7-liter jug.
Empty the 3-liter jug.
Pour the content of the 7-liter jug in the 3-liter jug.
Fill the 7-liter jug from the well.
Fill the 3-liter jug with water from the 7-liter jug.
The 7-liter jug now contains 5 liter.
```

References

- **H.D. Grossman (1940)**. A Generalization of the Water-Fetching Puzzle. *American Mathematical Monthly* **47(6)**, 374-375. [↗](#)

Hoe kan je exact 5 liter water afmeten uit een bron als je enkel beschikt over een kruik van 7 liter en een kruik van 3 liter? Dit soort vragen kom je vaak tegen in puzzelboeken. Meestal kunnen dergelijke problemen vrij eenvoudig opgelost worden op basis van intuïtie of via de methode van gissen-en-missen. In het boek *Scripta Mathematica* uit 1948 beschrijft H.D. Grossman echter een vernuftige methode om systematisch een oplossing te genereren.

Veronderstel dat beide kruiken een volume van a en b liter hebben en dat we c liter willen afmeten. Voor het gegeven voorbeeld is $a=7$, $b=3$ en $c=5$. Er moet gelden dat a en b twee verschillende positieve gehele getallen zijn, dat a en b relatieve priemgetallen zijn (hun grootste gemene deler is gelijk aan 1) en dat één van beide kruiken groter is dan het gevraagde volume c . Anders is het probleem onoplosbaar, triviaal, of kan het gereduceerd worden tot kleinere getallen.

de lijn OP ligt, anders naar de bovenbuur. De oplossing die we op deze manier aflezen kan gevonden worden door de rol van a en b om te wisselen in bovenstaande omschrijvingen. De alternatieve oplossing voor ons voorbeeld wordt dan

- Vul de 7-liter kruik aan de bron.
- Vul de 3-liter kruik op met water uit de 7-liter kruik.
- Giet de 3-liter kruik leeg.
- Vul de 3-liter kruik op met water uit de 7-liter kruik. (*er zit nu nog 1 liter water in de 7-liter kruik*)
- Giet de 3-liter kruik leeg.
- Giet de inhoud van de 7-liter kruik in de 3-liter kruik. (*de 3-liter kruik bevat nu 1 liter water*)
- Vul de 7-liter kruik aan de bron.
- Vul de 3-liter kruik op met water uit de 7-liter kruik. (*er wordt dus 2 liter water overgegoten*)
- De 7-liter kruik bevat nu 5 liter.

Grossman zei hierover in zijn boek "There are always exactly two solutions which are in a sense complementary to each other."

Opgave

- Schrijf een functie `positie` waaraan twee punten p_1 en p_2 moeten doorgegeven worden. Elk punt wordt voorgesteld door een tuple van twee natuurlijke getallen (x, y) . De functie moet een geheel getal teruggeven dat aangeeft of het punt p_2 op (waarde 0), boven (waarde 1) of onder (waarde -1) de rechte ligt die door de oorsprong $(0, 0)$ en het punt p_1 gaat.
Hint: Als p_1 het punt (a, b) is, dan wordt de rechte die dit punt verbindt met de oorsprong beschreven door de vergelijking $ay - bx = 0$. Voor punten boven deze rechte is $ay - bx$ positief, en voor punten eronder is deze waarde negatief.
- Schrijf een functie `broncode` waaraan de natuurlijke getallen a , b en c moeten doorgegeven worden. De functie moet de acties uitschrijven die nodig zijn om exact c liter water af te meten als je beschikt over een a -liter kruik en een b -liter kruik. Finaal moet ook uitgeschreven worden welke kruik de gevraagde hoeveelheid water bevat. Je mag er hierbij van uitgaan dat a en b verschillende positieve gehele getallen zijn, dat a en b relatieve priemgetallen zijn en dat één van beide kruiken groter is dan het gevraagde volume c . Zorg ervoor dat je implementatie dezelfde omschrijvingen van de acties gebruikt als in onderstaande voorbeeld staat aangegeven. De functie moet ook een optionele vierde parameter `alternatief` hebben, die aangeeft of de eerste oplossing (waarde `False`, de standaardwaarde) dan wel de alternatieve oplossing (waarde `True`) moet uitgeschreven worden.

Voorbeeld

```
>>> positie((3, 7), (3, 0))
-1
>>> positie((3, 7), (0, 3))
1
>>> positie((3, 7), (6, 14))
0
```

```
>>> broncode(7, 3, 5)
Vul de 3-liter kruik aan de bron.
```

Giet de inhoud van de 3-liter kruik in de 7-liter kruik.
Vul de 3-liter kruik aan de bron.
Giet de inhoud van de 3-liter kruik in de 7-liter kruik.
Vul de 3-liter kruik aan de bron.
Vul de 7-liter kruik op met water uit de 3-liter kruik.
Giet de 7-liter kruik leeg.
Giet de inhoud van de 3-liter kruik in de 7-liter kruik.
Vul de 3-liter kruik aan de bron.
Giet de inhoud van de 3-liter kruik in de 7-liter kruik.
De 7-liter kruik bevat nu 5 liter.

```
>>> broncode(7, 3, 5, alternatief=True)
```

Vul de 7-liter kruik aan de bron.
Vul de 3-liter kruik op met water uit de 7-liter kruik.
Giet de 3-liter kruik leeg.
Vul de 3-liter kruik op met water uit de 7-liter kruik.
Giet de 3-liter kruik leeg.
Giet de inhoud van de 7-liter kruik in de 3-liter kruik.
Vul de 7-liter kruik aan de bron.
Vul de 3-liter kruik op met water uit de 7-liter kruik.
De 7-liter kruik bevat nu 5 liter.

Bronnen

- **H.D. Grossman (1940).** A Generalization of the Water-Fetching Puzzle. *American Mathematical Monthly* **47(6)**, 374-375. [↗](#)