


Growth chart

To draw up a bacterial growth chart $y = f(t)$, the amount of bacterial cells y_i is determined spectrophotometrically on a regular basis t_i ($i = 1, \dots, n$).



To determine change in the growth chart, the derivative of the measured curve can be stipulated. Based on the derivative function, we learn where increasing and decreasing trends can be noticed and where the curve peaks. To determine an estimate of the derivative $y'_i = f'(t_i)$ at a time t_i ($1 < i < n$), one can use a formula for numeral derivation:
$$y'_i = f'(t_i) = \frac{1}{2} \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{t_{i+1} - t_i} + \frac{y_i - y_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \right)$$

Input

The input consists of 100 lines with two decimals t_i and y_i ($1 \leq i \leq 100$) on each line. Both values are always separated by a single space. This data represents the measurements of the growth chart $y = f(t)$ for the consecutive points in time. $t_i < t_j$ if $i < j$ is always true.

Output

Print a line for every measurement t_i , stating the value t_i and an estimate of the derivative $y'_i = f'(t_i)$, separated by a single space. In the outer points of the measuring data, there isn't enough information about the curve $y = f(x)$ to estimate the derivative. In this case, write a hyphen (-), instead of the value for the derivative.

Example

Input:


```
0.5 1
2 2
4 3
5.1 3.14
... ## and so on
```

Output:

```
0.5 -
2.0 0.58333333333333
4.0 0.313636363636
```

... ## and so on

Om een bacteriële groeicurve $y = f(t)$ te bepalen, wordt op regelmatige tijdstippen t_i ($i = 1, \dots, n$) het aantal bacteriële cellen y_i spectrofotometrisch bepaald.



Om na te gaan waar er zich veranderingen voordoen in de groeicurve, kan de afgeleide van de gemeten curve bepaald worden. Aan de hand van de afgeleide functie leren we waar er stijgende en dalende trends merkbaar zijn, en waar er zich pieken in de curve voordoen. Om een benadering van de afgeleide $y'_i = f'(t_i)$ op tijdstip t_i ($1 < i < n$) te bepalen, kan gebruik gemaakt worden van de formule voor numerieke afgeleiding:
$$y'_i = f'(t_i) = \frac{1}{2} \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{t_{i+1} - t_i} + \frac{y_i - y_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \right)$$

Invoer

De invoer bestaat uit 100 regels met op elke regel twee decimale getallen t_i en y_i ($1 \leq i \leq 100$). De twee waarden worden telkens van elkaar gescheiden door één enkele spatie. Deze gegevens stellen metingen van de groeicurve $y = f(t)$ voor op opeenvolgende tijdstippen t_i . Er geldt dus steeds dat $t_i < t_j$ als $i < j$.

Uitvoer

Schrijf voor elk meetpunt t_i een regel naar de uitvoer, met daarop de waarde t_i en een benadering van de afgeleide $y'_i = f'(t_i)$, van elkaar gescheiden door één enkele spatie. In de eindpunten van de meetgegevens is er niet voldoende informatie over de curve $y = f(x)$ beschikbaar om de afgeleide te kunnen benaderen. In dat geval moet een koppelteken (-) uitgeschreven worden in plaats van een waarde voor de afgeleide.

Voorbeeld

Invoer:

```
0.5 1
2 2
4 3
5.1 3.14
... ## enzoverder
```

Uitvoer:

```
0.5 -
2.0 0.583333333333
```

4.0 0.313636363636
... ## enzoverder